Observation sur La fracture du Col du femur

par M. Fabre m.e en chirurgie à Avignon.

L'experience nous apprend tous Les jours que Le col du femur se fracture non seulement dans son milieu mais, quelque fois dans ses extremittes; et que La fracture de Cette partie est toujours accompagnee de simptomes qui exigent de La part de L'artiste, qui se mele souvent avec des Connoissances moyennes d'en faire La Reduction, des attentions tres particulieres, L'obmission d'une desquelles expose Le Blessé aux plus grandes disgraces.

Cette fracture est d'autant plus facheuse qu'il y a des forts muscles, dont il faut vaincre la force, non seulement au moment qu'on fait La Reduction; mais meme pendant tout Le temps du traitement. si on n'a Cette precaution, La partie est insensiblement entrainée au haut de La fesse par L'action des muscles qui en dirigent Les mouvements.

Les signes de cette fracture sont amplement detaillés dans Les traités des maladies des ôs; mais dans Certaines circonstances, La cure qu'elle exige, ne depend pas souvent de L'adresse du chirurgien, sur tout, chez Les personnes grasses, et principalement chez Les femmes, ou L'on n'apperçoit que Bien difficillement Cette fracture.

D'abord La fait est certain, qu'en examinant La partie fracturée on en Reconnoit Le derrangement, et sans autre examen, on procede a La cure; mais Cela ne suffit pas toujours pour Remedier a Ce deplacement; il faut distinguer

ARC 31 d 3 d 57

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'endroit du col du femur ou est La fracture; Car plus elle est eloignée de La tete de cet ôs et plus facilement Le grand trocanter est tiré en haut par Les puissants muscles qui s'y attachent. il n'en est pas de meme, Lorsque La fracture est située prés La tête de cet ôs: alors, La partie integre du col trouve un appui solide contre Le Bord de La cavité cotiloide; de la vient que Les muscles qui entrainent La cuisse en haut par leur action y Rencontrent un empechement et dans ce cas, La seule situation et Le Repos de La partie, sont des moyens assurés pour en obtenir La cure; et comme cette fracture n'arrive pas constamment au meme endroit du col de cet ôs ainsi que je L'ai observé; elle exige de La part du chirurgien une manœuvre Relative au deplacement

Lorsqu'on croit avoir fait La Reduction de cette fracture ou L'on peut facilement se tromper, on doit etre attentif a ce qui se passe. on connoit que La fracture est située prés La tete de L'ôs, Lorsque La cuisse conserve sa Longueur, et alors, on place cette partie en haut et un peu en dehors; moyennant cette attention, on evite qu'elle soit tirée en haut par L'action des muscles destinés a cet usage: si, au contraire, on porte L'extremitté de La cuisse en dedans et en bas, alors, La cuisse peut etre entrainée en haut parceque Le col est degagé du sourcil de La cavité cotiloide, et dans cette situation, il favorise La contraction des muscles. contraction qui devient spontanée a cause du peu de Resistance qu'elle trouve du coté des ôs.

Si La fracture est située prés du grand trocanter c'est a dire, dans La partie evasée du col du femur, dans ce cas, L'extension et La contre-extension doivent etre employées tout Le temps qu'il faut pour La formation du cal: car il ne suffit pas d'appliquer un Lacq au bas de La cuisse ou de La jambe comme certains empiriques Le pratiquent et meme certains

Chirurgiens qui se font une gloire de les imiter. Cette Conduite est aussi Ridicule, qu'elle est fautive. en effet, si on en examinoit tant soit peu le Resultat on voit que non seulement Cette extension n'opere Rien, mais qu'elle peut etre prejudiciable; Car, seroit-il possible que l'extension qu'on exerce sur une partie puisse avoir son effet si, en meme temps on ne fait la Contre-extension: Cela est aussi faux, qu'il est peu Raisonnable d'en croire la possibilité: ainsi quand le Col du femur est fracturé vers le grand trocanter, et qu'on Croit en avoir fait la Reduction, C'est dequoy une main habile ne peut se flater, l'application des Lacqs sur la partie diametralement opposées, est le secours le plus efficace qu'on puisse preter a la nature: etant un fait Certain que dans les fractures, les os etant Replacés les vaisseaux osseux fournissent une matiere qui leur est analogue et qui en fait la Reunion: si cela n'arrivoit ainsi le suc osseux qui est versé dans l'endroit fracturé formeroit des difformittés qui, bien souvent seroient nuisibles aux mouvements de la partie.

Ces Reflexions etant faites, on voit qu'il ne suffit pas dans la fracture du col du femur, d'appliquer un Lacq a l'extremitté inferieure de la Cuisse ou de la jambe qu'il faut egalement en appliquer un a l'extremitté superieure. Les appareils et les Bandages dont on se sert dans le traitement de Cette fracture doivent etre Renouvellés souvent ou bien ou bien dès les premiers jours, l'on ne doit point en employer, et pour avoir la facilité d'observer plus particulierement les Circonstances qui en sont inseparables:

Quoiqu'on Sçache que les Bandages dans les fractures.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

de cette partie, soient d'un petit secours; cependant, quand ils sont faits a propos, ils soulagent beaucoup les malades et rendent les mouvements de la partie plus faciles moins douloureux et moins exposés a occasionner une récidive. il convient donc, d'en faire usage dans tous les cas ou leur application paroit etre de quelqu'utilité: d'ailleurs, ils ne sont jamais nuisibles, lorsqu'on peut les renouveller sans causer du derrangement a la partie.

~~Moyen de porter un liquide dans la bouche sans violence lorsque cette partie est fermée accidentellement~~ N.° 1

~~Lorsqu'on est appellé auprès d'un malade dont la fracture de la machoire inferieure ou son etat spasmodique interdit l'usage de la déglutition, on peut sans faire la moindre violence pour lui ouvrir la bouche et sans lui casser des dents introduire les liquides dans cette cavité par une [illegible] aisée et aucunement dommageable. La bouche étant fermée exactement, il y a toujours une voye ouverte au dehors; on trouve [illegible] de [illegible] pour arriver dans cette cavité, sans exposer le malade aux surprises que pourroit causer un liquide porté par les narines; mais on y fait peu d'attention. On sçait qu'entre les dernieres dents maxillaires et les apophyses coronoides il y a un vuide que ce vuide répond dans la bouche a côté de l'entrée du gosier or, cela étant ainsi c'est une voye qu'on a toujours ouverte pour porter les liquides necessaires aux besoins du malade.~~